




Legenda

1 - Geologia

- Alluvioni recenti e terrazzati (*Alluvium recente* Auct.)**
Litologia: alluvioni sabbioso-ghiaiose con ciottoli con strato di alterazione assente o debolmente sviluppato, associati a frequenti intercalazioni limoso-argillose di spessore decimetrico.
Unità di pedopasaggio: superfici subplaneggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d'acqua da cui sono generalmente separate da gradini morfologici con pendenza media dello 0,5% e suoli sviluppatisi su depositi alluvionali prevalentemente sabbioso-limosi o ghiaiosi. Superfici caratterizzate da elevata pietrosità superficiale con soggiacenza della falda che oscilla entro i 200 cm. Uso del suolo prevalente a prati permanenti, cereali tipo mais, pioppeti. Suoli molto profondi su orizzonti sabbiosi a scheletro abbondante, scheletro frequente fino a 65 cm, abbondante al di sotto, a tessitura da media a moderatamente grossolana, con reazione neutra, subacida in profondità, saturazione bassa o media, AWC moderata, drenaggio buono, localmente mediocre a seguito delle oscillazioni periodiche della falda e permeabilità moderata.
- Fluvioglaciale Wurm (*Alluvium antico* Auct.)**
Litologia: alluvioni sabbioso-ghiaiose limose limitate al fondo dei solchi vallivi con strato di alterazione brunastro di spessore ridotto.
Unità di pedopasaggio: valli alluvionali oloceniche in ambiente terrazzato da alluvioni antiche (suoli caratteristici dei terrazzi stabili dell'Olna, a morfologia subplaneggiante con pendenza media dello 0,8%) con pietrosità superficiale comune in cui prevalgono lembi boscati e prati irrigui. Substrato di natura sabbiosa limosa con ghiaia, non calcareo; suoli da profondi o molto profondi a tessitura da media a moderatamente grossolana con scheletro comune, reazione subacida, saturazione media, CSC medio-bassa, AWC alta, drenaggio buono e permeabilità moderata o poco profondi per tessitura fortemente contrastante, da moderatamente grossolana e scheletro da comune a frequente in superficie a grossolana e scheletro da frequente ad abbondante in profondità, con saturazione molto bassa, CSC bassa, AWC molto bassa, drenaggio rapido e permeabilità moderatamente elevata.
- Fluvioglaciale Wurm/Riss (*Diluvium recente* Auct., "*Niedertassenschotter*" Penck)**
Litologia: prevalenti ghiaie sabbiose con ciottoli a scarsa matrice interstiziale; occasionale occorrenza di livelli/banchi debolmente cementati (conglomerati e/o arenarie grossolane) e/o sporadiche lenti sabbiose isolate; profilo di alterazione superficiale di spessore generalmente ridotto (40-150 cm) costituito da sabbie e ghiaie con ciottoli in abbondante matrice limoso argillosa bruno-rossastra.
Unità di pedopasaggio: sottosistema dell'alta pianura ghiaiosa del livello fondamentale della pianura a morfologia subplaneggiante con pendenza media dello 0,3% con uso del suolo prevalente a bosco e seminativi. Suoli da molto profondi con scheletro abbondante e tessitura grossolana, reazione acida, saturazione molto bassa, non calcarei, AWC bassa, con drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata a moderatamente profondi limitati da substrato ghiaioso e da orizzonti con scheletro molto abbondante, a tessitura moderatamente grossolana fino a 75 cm e grossolana al di sotto, scheletro abbondante, reazione subacida, saturazione da bassa a molto bassa, CSC media in superficie e molto bassa in profondità, AWC bassa, drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata.
- Fluvioglaciale Riss (*Diluvium medio*, *Riss alluvionale* Auct., "*Hochterassenschotter*" Penck)**
Litologia: prevalenti ghiaie sabbiose, con matrice argillosa interstiziale con strato di alterazione superficiale ocreo ("Ferretto") di spessore mediamente variabile fra 200-300 cm.
Unità di pedopasaggio: superfici pianeggianti del livello fondamentale della pianura, caratterizzate da consistenti depositi colluviali o alluvionali che ricoprono le ghiaie inalterate o poco alterate, con pendenza media dello 0,3% alla base dei rilievi o nelle zone ove le correnti fluvioglaciali e fluviali entrarono in fase di stanca, con suoli sviluppatisi su substrati ghiaiosi a matrice sabbiosa o limoso-sabbiosa. Uso del suolo prevalente a latifoglie caducifoglie, subordinatamente da seminativi. Suoli moderatamente profondi limitati da substrato sabbioso con scheletro abbondante, con scheletro comune e tessitura media in superficie, grossolana in profondità, reazione acida, saturazione molto bassa o secondariamente bassa, AWC alta, con drenaggio buono e permeabilità moderata.

2 - Geomorfologia

-  Terrazzo morfologico
-  Limite comunale



COMUNE DI RESCALDINA
PROVINCIA DI MILANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
aggiornamento 2017
L.R. 11 marzo 2005, n° 12 s.m.i.

ALLEGATO 1
CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO
scala 1:10'000
(base topografica: stralcio sezioni A5c2, A5c3, A5d2, A5d3 Carta Tecnica Regionale)



Studio Tecnico Associato di Geologia
Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332/464105 - fax. 0332/870234
e_mail: tecnico@gedageo.it

Dott. Geol. Roberto Carimati

Dott. Geol. Giovanni Zaro

gennaio 2017